

DESCRIPTIONS

D'ARACHNIDES NOUVEAUX D'AFRIQUE

Par M. E. SIMON

(Séance du 25 janvier 1884.)

Genus RUNCINIOPSIS gen. nov.

Cephalothorax longior quam lator, antice posticeque truncatus rectus, fere parallelus sed antice abrupte angustior, fronte lata, transversim obtuseque carinata cum angulis acutis et antice oblique productis. Oculi postici fere æqui, lineam paulo recurvam formantes, fere æquedistantes. Oculi antici lineam magis recurvam formantes, mediis minoribus et inter se paululum magis quam a lateralibus remotis. Oculi medii trapezio vix longiore quam latiore et antice angustiore positi. Clypeus verticalis, planus, area oculorum multo angustior. — Sternum ovato elongatum. — Labium longius quam latius, antice attenuatum et obtusum, dimidium laminarum superans. — Abdomen angustum parallelum. — Pedes 1, 2, 4, 3, valde inæquales, pedes 1 et 2 posterioribus multo longiores et crassiores, pedes I evidenter longior quam 2; tibiis metatarsisque I et II subtus longe seriatim aculeatis, articulis reliquis cunctis inermibus.

Generis *Runciniæ* affinis sed cephalothorace sternoque multo longioribus quam latioribus et pedibus 2ⁱ paris multo brevioribus quam pedibus 1ⁱ paris abunde differt.

1. RUNCINIOPSIS FLAVIDA sp. nov.

♀ Long 5^{mm}.

Flavo testacea, cephalothorace lineis duabus exilibus dorsalibus fuscis notato, carina et angulis frontis albo opacis, clypeo rufobrunneo, chelis antice rufis linea flava oblique secatis. — Abdomen longissimum fere parallelum, antice truncatum, postice paulo attenuatum et obtusum ultra mamillas paulo productum, utrinque longitudinaliter striatum. Pedes I et II tibiis metatar-

sisque spinarum longissimarum seriebus duabus subtus instructis, femoribus I et II et pedibus 4 posterioribus inermibus.

Zanzibar, ab A. Raffray reperta.

Genus GASTERACANTHA Latr.

Subgen. *Tetracantha* E. S., *Hist. N. Ar.*, 1864, p. 285.

2. GASTERACANTHA SEPULCHRALIS sp. nov.

♀ Scutum abdominale long. 4,6^{mm}; lat. 6,5^{mm}.

Cephalothorax ater, nitidus, leviter strigosus, breve et parce pubescens, in medio convexus et obtusissime bituberculatus. Pedes nigri vel fusco-picci, metatarsis, præsertim ad basin, paulo rufescentibus. Scutum abdominale latius quam longius, parum convexus, utrinque attenuatum et unispinosum, postice bispinosum, supra læve haud granulosum nec punctatum nigro cyaneum, ad marginem anticum maculis parvis tribus a sese longe remotis, in medio pone spinas laterales utrinque maculis duabus majoribus elongatis et obliquis fere confertis, postice utrinque macula parva læte flavis ornatum; spinis æquis, brevibus et acutis, valde et parce granulosis atque setulosis; ocellis anticis 10 parvis, ocellis mediis parvis præsertim anticis trapezium latius quam longius et postice quam antice multo latius formantibus. Venter valde granulosus, niger, ad marginem anticum macula parva flava utrinque notatus.

Madagascar (coll. E. Simon).

3. GASTERACANTHA RUFITHORAX sp. nov.

♀ Scutum abdominale, long. 4,7^{mm}; larg. 7^{mm}.

Cephalothorax rufescens, nitidus, haud strigosus, parce albo pubescens, in medio convexus vix sulcatus, area oculorum mediorum vix prominula. Pedes læte rufescentes, tibiis, metatarsis tarsisque ad apicem infuscatis. Scutum abdominale paulo longius quam latius, utrinque arcuatum, paulo attenuatum et unispinosum, postice bispinosum, supra fere planum, læve haud punctatum nec granulosum, læte albo flavescens, vitta marginali nigra intus valde bidentata et sæpissime in medio punctis duobus nigris ornatum; spinis rufulis, brevibus, æquis, ad basin latis sed valde acutis, parce et valde granulosis et setulosis; margine pos-

tico rufescente sæpe biflavo maculato leviter granuloso. Venter valde et sat dense granulatus, in medio niger præterea fusco rufescens maculis flavis numerosis notatus.

Madagascar (coll. E. Simon).

4. *GASTERACANTHA NIGRIPES* sp. nov.

♀ Scutum abdominale, long. 4,7^{mm}; larg. 7^{mm}.

Cephalothorax niger, nitidus, evidenter strigosus, breve et parce pubescens, in medio convexus et obtuse bituberculatus, area oculorum mediorum prominula. Pedes nigerrimi, metatarsis tarsisque omnibus atque tibia IV ad basin obscure fulvo annulatis. — Scutum abdominale multo latius quam longius, fere planum, utrinque valde attenuatum et unispinosum, postice bispinosum, supra læve, haud granulatum nec punctatum, læte albo-flavescentis, utrinque vitta marginali nigra extus valde arcuata atque spinas laterales includente ornatum; spinis acutis valde et parce granulosis, lateralibus quam posticis multo longioribus; margine postico inter spinas posticas granuloso, nigro biflavo punctato; ocellis nigris parvis. Venter niger, valde et dense granulatus, in medio punctis flavis minimis quatuor in quadratum dispositis utrinque punctis et maculis, præsertim ad marginem, notatus.

Madagascar (coll. E. Simon).

5. *LARINIA LONGISSIMA* sp. nov.

♀ Long. 9,5^{mm}.

Cephalothorax angustus, elongatus, sat convexus, albo testaceus, longe albo pubescens, linea media fusca diluta, et linea marginali exillima notatus. Oculi medii trapezium paulo longius quam latius et antice quam postice multo latius formantes, posticis confertis, anticis majoribus atque a sese valde remotis. Sternum angustum, fere parallelum, postice acuminatum, fulvum, ad marginem paulo infuscatum. Abdomen longissimum et angustum, fere parallelum, antice posticeque valde attenuatum fere acutum, supra sordide testaceum, vitta media lata et integra albida notatum, infra in medio longitudinaliter infuscatum, pube alba setis validis et longis albis ad basin infuscatis supra parce intermixta vestitum. Pedes longissimi et gracillimi, (antici posticis evidenter longiores) albo testacei fere pellucetes, posticis supra parce nigro punctatis, femoribus, patellis, tibiis, metatarsisque longe fusco aculeatis. — Vulva scapo verticali, transversa, in

medio profunde emarginato, unco gracili et brevi recto apicem scapis haud attingenti.

Zanzibar (coll. E. Simon) a Raffray reperta. *L. Dufouri* E. S. et *lineata* Luc. corpore pedibusque multo angustioribus facile differt; *L. Chloreis* Sav. abdominis pictura, pedibus anticis multo longioribus quam posticis, forma vulvæ, etc., distinctissima.

Genus POLTYS C. Koch.

Poltys C. Koch., *Ar.*, X, p. 97, 1843.

Pleuromma Dolesch., *Verh. d. Naturw. V. Nederl. Ind.*, V., 1839.

Cyphagogus Günther, *Ann. mag. n. h.*, 3^e sér., vol. X, 1862.

Cyphonethis Thorell, *On eur. Spid.*, I, p. 37, 1870.

Mastigosoma Ausserer, *Verh. z. b. Ges. Wien*, p. 815, 1871.

6. POLTYS FURCIFER sp. nov.

♀ Cephal.th., long. 3,5^{mm}. — Abd., long. 4^{mm}; alt. 15^{mm}.

Cephalothorax obscure fulvo testaceus, longe albo pubescens, parte thoracica postice convexa et abrupte declivi, supra late et profunde sulcata, parte cephalica fere parallela postice valde convexa. Oculi medii in tuberculum crassum et obtusum fronte vix angustius positi, æqui, aream longiorem quam latiore et antice quam postice vix angustiore occupantes. Oculi laterales antici a mediis anticis sat approximati, oculi laterales postici longe remoti. Abdomen breve, altissimum et supra et infra longe productum, supra verticale parum attenuatum, sed versus apicem abrupte angustius cum utrinque tuberculo obtuso instructum, dein gracile, depressum, antice arcuatum atque ad apicem obtuse bifurcatum, antice obscure fuscum, postice obscure rufescens fusco punctum cum maculis duabus confertis angulatis flavis albo marginatis versus basin ornatum. Pedes robusti rufi, patellis, tibiis II et III totis, tibiis I et IV ad apicem, metatarsis tarsisque valde infuscatis; tibia II reliquis paululum crassiore et paulo arcuata; femoribus inermibus, reliquis articulis spinis rufis armatis, tibiis metatarsisque I et II (præsertim II) intus spinosissimis.

Zanzibar (Raffray; mus. E. Simon).

Species abdomine supra maxime producto et furcifero valde insignis.

7. *POLTYS LARVATA* sp. nov.

♀ Ceph.th., long. 4^{mm}. — Abd., long. 3^{mm}; alt. 9^{mm}.

Cephalothorax flavo testaceus, longe albo pubescens, parte thoracica valde convexa et postice abrupte declivi, supra profunde sed tenue sulcata, parte cephalica haud convexa, antice longe et valde attenuata, tubere oculorum altissimo, verticale conico. Oculi medii fere æqui, trapezium fere æque longius ac latius et antice quam postice paululum latius formantes. Oculi laterales minimi a sese parum disjuncti. Abdomen breve, altissimum, plus duplo altius quam latius et longius, et infra et supra longe productum, infra valde attenuatum et acute conicum, supra sensim dilatatum et paulo compressum, ad apicem truncatum atque aream dorsalem longiorem quam latiore formante, postice verticale atque tuberculorum parvorum geminorum 3 vel 4 serie notatum; area dorsali antice truncata cum angulis paulo convexis et breve trituberculatis, postice rotundata et tuberculis duobus geminatis et obtusis instructa; cinereo-albidum paulo fusco venosum, area dorsali dilutior, fere sordide alba sed macula unica fusca rhomboedra in medio ornata — Sternum rufescens. — Pedes longissimi et graciles, fulvo-rufescentes, breve flavo pubescentes, femoribus ad apicem tibiisque infuscat; tibiis I et II gracilibus et longis evidenter curvatis, aculeis nigris brevibus parce instructis; tibia IV gracili, paulo curvata et paulo depressa. — Vulva unco sat longo, testaceo et parallelo, scapo fusco ovali.

Zanzibar (A. Raffray; mus. E. Simon).

Species insignis, forma insolita abdominis, pedibus longissimis, oculis lateralibus inter se approximatis valde distincta.

8. *MIAGRAMMOPES RAFFRAYI* sp. nov.

♀ Long. 7^{mm}.

Cephalothorax obscure fusco olivaceus, lævis, albo pubescens, plus duplo longior quam latior, postice sensim et leviter attenuatus, in parte cephalica evidenter latior sed haud angulosus, supra fere planus, pone oculos biimpressus, margine antico arcuato haud producto nec conico. Oculi lineam parum recurvam formantes, lateralibus paulo majoribus et a margine cephalothoracis magis quam ab oculis mediis approximatis; oculi medii inter se multo longius quam a lateralibus remoti. — Abdomen angustum, longissimum, cephalothorace plus duplo longius, utrinque

paullo sinuosum, antice posticeque truncatum haud coarctatum, supra fulvo rufescens, nigro irregulariter maculatum atque linea media nigricante integra ornatum, subtus omnino nigrum, pube lanuginosa albida vestitum. — Pedes antiei fusci tarso paulo dilutiore; pedes II et III obscure fulvi; pedes IV olivacei tibia bi fulvo annulata, metatarso rufescente; pedes antici longissimi robustissimi tibia compressa, metatarso paullo depresso utrinque leviter carinato; pedes IV metatarso tibia brevior, valde compresso, supra paulo emarginato.

Zanzibar (Raffray; mus. E. Simon).

Singulum exemplum femineum hujus Araneae vidi. *M. Guliveri* Butler, ex ins. Rodriguez, *M. Raffrayi* affinis est sed certe diversus.

9. LOXOSCELES COMPACTILIS sp. nov.

♀ 4,6^{mm}.

Cephalothorax fulvo rufescens, vittis fuscis duabus postice convergentibus in parte cephalica notatus. Oculi fere æqui, approximati, mediis lateralibus vix magis promotis, oculis mediis a lateralibus intervallo diametro oculi vix latiore separatis. Clypeus sat angustus, antice paulo arcuatus. Abdomen cinereo fulvum pilis tenuibus et longis parce vestitum. Pedes fulvo pallide testacei.

Algiria : Batna (F. Lataste).

L. rufescenti et *erythrocephalæ* differt oculis multo minus disjunctis atque mediis vix magis promotis quam lateralibus.

Genus CYRTAUCHENIUS Th. 1870.

Cyrtcephalus H. Lucas, *Expl. Alg. Ar.*, p. 92, 1842.

Cyrttauchenius Thorell, *On eur. Spid.*, p. 167, 1870.

— Ausserer, *Beit. z. Kennt. Territ.*, p. 45, 1871.

SPECIES ALGIRICÆ.

1 — *Sectio*.

Cephalothorax latissimus, parum longior quam latior, parte thoracica postice vix attenuata. Oculi antici æqui, lineam paulo procurvam formantes. Oculi medii postici a lateralibus posticis multo magis quam a mediis anticis approximati. — Pedes robu-

tissimi et breves, I et II haud spinosi vel metatarsis spina unica subtus ad apicem instructis; scopulæ tarsorum metatarsorumque I et II crassæ et integræ.

10. CYRTAUCHENIUS WALCKENAERI H. Lucas, *loc. cit.*, p. 94, pl. I.
♀ Long. 27^{mm}.

Cephalothorax fusco castaneus, fere lævis, parte cephalica fere glabra, vitta media setigera notata, parte thoracica sat dense et longe flavo pubescente. — Pedes fusco castanei; femoribus, patellis, tibiisque I et II inermibus, metatarsis subtus ad apicem spina unica instructis; patella III extus spinis brevibus 2, tibia III et intus et extus bispinosa atque supra ad basin unispinosa; metatarsis III et IV spinosis; scopulis tarsorum metatarsorumque I et II crassis et integris, scopulis posticis setis intermixtis.

Algiria : Constantine (H. Lucas).

2 — *Sectio*.

Cephalothorax elongatus, parte thoracica postice valde attenuata. Oculi antici lineam valde procurvam formantes, mediis lateralibus minoribus. Oculi medii postici versus medium intervalli oculorum mediorum anticorum et lateralium posticorum siti. Pedes sat longi, parum robusti, aculeati; scopulæ metatarsorum I et II subtus in medio longitudinaliter interruptæ.

11. CYRTAUCHENIUS VITTATUS sp. nov.

♀ Long. 21^{mm}.

Cephalothorax obscure fulvus, parte cephalica infuscata, fere lævis, subtilissime coriaceus, nitidus. Series oculorum antica valde procurva, oculis mediis lateralibus plus triplo minoribus. — Abdomen testaceum, supra vitta lata fusco-violacea diluta notatum. — Pedes fulvi, femoribus cunctis, patellisque I et II inermibus; tibia I subtus extus serie spinarum validarum 6, tibia II spinis 5 longis et gracilibus subtilus armatis; patella III extus, tibia III extus et supra, metatarso toto, tarsoque supra spinosissimis; tibia IV subtus spinarum gracillarum fere setiformium serie unica notata; metatarso tarsoque IV subtus spinis numerosis armatis. — Coxæ pedum maxillarium setulosæ haud spinulosæ.

Algiria : Batna (mus. E. Simon).

12. CYRTAUCHENIUS GRACILIPES H. Lucas, 1842.

♂ *Mygale gracilipes* H. Lucas, *Expl. Alg. Ar.*, p. 91, pl. I, fig. 2.♀ *Cyrtocephalus terricola* H. Lucas, *loc. cit.*, p. 95, pl. I, fig. 4.♂ Long. 12-13^{mm}.

Cephalothorax elongato ovatus, sat angustus, fulvus, parte cephalica infuscata, fere lævis, subtile parceque coriaceus, parte cephalica sat convexa, parte thoracica margine postico spinis longis paucis instructa; area oculorum haud convexa. Oculi antici lineam procurvam formantes, mediis paulo minoribus, fere æquedistantes. — Pedes elongati, parum robusti, fulvi; femore I spinarum (3 vel 6) serie unica, femoribus reliquis seriebus tribus supra armatis; patella I intus bispinosa, extus ad basin unispinosa, subtus utrinque spina unica armata; patella II intus ad apicem unispinosa; patella III antice spinosissima; patella IV inermi; tibiis metatarsisque omnibus spinosis; tibia metatarsoque I rectis, metatarso I subtus spinis 3 minimis armato; tarsis I et II inermibus; III et IV paullo dilatis utrinque breve spinosis. — Pedes maxillares longi, fulvi. — Abdomen supra fusco-violaceum, infra obscure testaceum, antice spinosum.

♀ Long. 23^{mm}.

Cephalothorax obscure fuscus postice dilutior, fere lævis, subtile coriaceus, nitidus. Series oculorum antica valde procurva mediis fere duplo minoribus. Abdomen supra fuscum subtus obscure testaceum, — Pedes obscure fulvo rufescentes; spinæ pedum ut in *C. vittato* dispositæ. — Pedum maxillarium coxæ spinulis setisque munitæ.

Algiria : Oran (H. Lucas); Daya (L. Bedel).

C. gracilipes ♀ a *C. vittato* differt præsertim oculis anticis minus inæqualibus atque coxis pedum maxillarium spinulosis.

13. CYRTAUCHENIUS LURIDUS sp. nov.

♂ Long. 12^{mm}.

Cephalothorax elongato ovatus sat angustus, fulvus, parte cephalica infuscata, linea media exili nigra notata, fere lævis nitidus, antice subtile rugosus; parte cephalica humili parum convexa, parte thoracica margine postico spinis nigris paucis validis et brevibus armata; area oculorum vix convexa. — Oculi antici lineam valde procurvam formantes, mediis lateralibus plus triplo

minoribus, fere æquedistantes. — Pedes elongati, parum robusti, fulvi; femore I supra spinarum (5 vel 6) serie unica, reliquis femoribus seriebus tribus supra armatis; patella I intus bispinosa, subtus ad apicem unispinosa; patellis II et IV inermibus; patella III antice spinis brevibus 10 vel 12 irregulariter armata; tibiis metatarsisque cunctis spinosis; tibia metatarsoque I rectis, tibia intus spinis 3 seriem unicam formantibus, metatarso subtus spinis 3 armatis; tarsis I et II extus breve bispinosis; tarsis III et IV gracilibus et cylindricis haud spinosis. — Pedes maxillares longi, fulvi. — Abdomen supra in medio subtus ad apicem fuscum, præterea fulvum, antice spinosum.

Algiria: Tlemcen (L. Bedel).

Species valde distincta præsertim oculis anticis maxime inæqualibus, parte cephalica humili, tarsis posticis cylindricis atque inermibus.

14. CYRTAUCHENIUS LATASTEI sp. nov.

♂ Long. 10^{mm}.

Cephalothorax elongato ovatus sat angustus, pallide lucidus, in parte cephalica linea media exili fusca notatus, fere lævis, nitidus, antice subtile rugosus, parte thoracica margine postico spinis nigris, sat brevibus armata; area oculorum vix convexa. Oculi antici lineam procurvam formantes, fere æqui, mediis vix minoribus, valde approximati sed mediis a sese magis quam a laterilibus remotis. — Pedes longissimi, parum robusti, fulvo testacei; femore I supra spinis 6 ordine unica dispositis, reliquis femoribus seriebus tribus supra armatis; patella I intus spinis 3 (ultima longiore) extus et subtus unispinosa; patella II intus bispinosa; patella III antice spinis irregularibus 8 vel 10, supra serie spinarum 6 vel 8 armata; patella IV inermi; tibiis metatarsisque omnibus spinosis; tibia I recto intus spinis 7 vel 8 series duas formantibus armata; metatarso I evidenter curvato subtus spinarum parvorum 7 vel 8 serie unica armato; tarsis I et II extus breve bispinosis; tarsis III et IV gracilibus, cylindricis et inermibus. — Pedes maxillares longi pallide testacei. — Abdomen testaceum supra infuscatum.

Algiria: Bou-Saada (F. Lataste).

Species distinctissima, præsertim oculis anticis fere æquis atque valde approximatis.

15 CYRTAUCHENIUS DAYENSIS sp. nov.

♂ Long. 16^{mm}.

Cephalothorax late ovatus, niger vel obscure fusco piceus grosse et parce rugoso coriaceus, in medio, versus foveam, fere lævis; parte cephalica parum convexa, parte thoracica margine postico spinis paucis sat brevibus armata; area oculorum parum convexa. — Oculi antici lineam procurvam formantes, fere æquedistantes, mediis minoribus. — Pedes robusti, sat longi, fusco picei; femoribus omnibus spinarum seriebus tribus supra armatis; patella I intus ad apicem bispinosa, subtus ad apicem intusque bispinosa; patella II intus spinis 2 subtus spina unica instructa; patella III antice spinosissima; patella IV inermi; tibiis metatarsisque cunctis spinosis; tibia I elongata, evidenter curvata et infra et intus spinosissima; metatarso I paulo curvato spinis 6 seriem unicam formantibus subtus instructo; tarso I spinis duabus minutissimis armato; tarsis posticis paulo dilatatis utrinque breve spinosis. — Pedes maxillares longi, obscure fusci. — Abdomen supra nigricans infra obscure testaceum, antice spinosum.

Algiria : Daya (L. Bedel).

16. CYRTAUCHENIUS BEDELI sp. nov.

♂ Long. 15,5^{mm}.

Cephalothorax niger, late ovatus, crassus, grosse et parce coriaceo rugosus, in medio versus foveam fere lævis; parte cephalica sat convexa; parte thoracica margine postico spinis brevibus paucis armata, area oculorum valde convexa. — Oculi antici lineam procurvam formantes, mediis minoribus, fere æquedistantes. — Pedes robusti, parum longi, fusco picei; femoribus omnibus spinarum seriebus tribus supra armatis; patella I intus bispinosa extus ad basin et subtus unispinosa; patella II intus bispinosa; patella III antice spinosissima; patella IV inermi; tibiis metatarsisque cunctis spinosis; tibia I brevi, recta, intus spinis paucis mediocribus, subtus spinis validis armata; metatarso I recto infra spinis 10 vel 12 instructo; tarsis I et II inermibus; tarsis posticis depressis, distincte dilatatis, elongato ovalibus utrinque breve spinosis. — Pedes maxillares longi, fusco picei. — Abdomen supra nigricans infra fusco testaceum, antice spinosum.

Algiria : Sebdou (L. Bedel).

Præcedenti affinis, differt pedibus brevioribus et robustioribus, tibiis metatarsisque anticis rectis, etc.

17. PACHYLOMERUS ÆDIFICATORIUS Westw., 1840.

Actinopus ædificatorius Westw., *Trans. of the Ent. Soc. of Lond.*, III, p. 170, pl. X, f. 1 à 25. (1840).

Actinopus algerianus H. Lucas, *Expl. Alg. Ar.*, p. 96, pl. I, f. 5 (1842).

Cette espèce appartient au genre *Pachylomerus* Auss., le caractère du tibia de la 3^e paire est même très proncé.

L'identité des *A. ædificatorius* Westw. et *algerianus* Luc. ne paraît pas douteuse.

Cette espèce est commune aux environs de Bône.

18. ATYPUS CORIACEUS sp. nov.

♂ Long. 8^{mm}.

Cephalothorax rufo-piceus, parte cephalica dense coriacea, parte thoracica, præsertim versus marginem striolis, variolosis irregulariter impressa. Tuber oculorum obtusum. Oculi antici approximati, mediis multo majoribus et inter se paulo magis quam a lateralibus remotis. Chelæ rufo piceæ, parce granulosæ, margine inferiori dentibus 12 fere æquis armato. Sternum transverse striatum, impressionibus 4 anterioribus minutissimis. Pedes obscure fulvi, metatarsis I, II et III supra atque tibia III antice valde spinosis; tarsis II et III spinis parvis supra parce instructis. Pedes maxillares normales.

Algiria : Daya, ab L. Bedel repertus.

A. affinis Eich. fere similis sed differt tarsis pedum II et III supra aculeatis, metatarsis multo magis spinosis atque sterni impressionibus anticis minutissimis subpunctiformibus; *A. piceo* Sulz. cephalothorace coriaceo atque oculis anticis a sese multo magis approximatis abunde differt.

CHERNETES DE LA BASSE ÉGYPTE

Recueillis par M. A. LETOURNEUX.

1. CHELIFER SUBRUBER E. Simon, *Ar. Fr.*, VII, p. 30.

Ramlé, près Alexandrie (A. Letourneux).

2. CHELIFER LETOURNEUXI sp. nov.

Long. 4^{mm}.

Cephalothorax fuscus, postice sensim dilutior, longior quam latior, fere parallelus, antice haud attenuatus sed rotundatus, supra planus, parum nitidus, subtile reticulato-striatus, strigis transversis nullis, oculis obsoletis vel nullis, pilis simplicibus et brevibus parce vestitus. Segmenta abdominalia testacea nitida setis fulvis gracilibus sat longis ordinibus transversis dispositis ornata. Pedes maxillares obscure brunneo rufescentes, robustissimi parum longi; coxa diluta nitida; trochantero longiore quam latiore, postice parum supra valde convexo; femore breve pediculato, crassissimo haud attenuato, antice leviter cavato, postice regulariter convexo, supra antice subtile rugoso, postice et infra fere lævi; tibia sat longe et anguste pediculata, dein late ovata et intus et extus fere æqualiter convexa, longiore quam latiore ad basin regulariter attenuata fere lævi; manu tibia parum latiore fere parallela, ad basin fere recta, et supra et infra nitidissima, digitis robustissimis manu plus duplo brevioribus; pedum maxillarium articulis cunctis setis albis simplicibus sat longis parce munitis. Pedes breves, albo-testacei, fere pellucents.

Trouvé en grand nombre, par M. A. Letourneux, près de Mariout, sous les pierres et les touffes d'un talus.

Voisin de *C. politus* E. S., dont il diffère par le céphalothorax plus fortement réticulé, le tibia de la patte-mâchoire plus large, la main très lisse en dessous, nullement rugueuse près des doigts. — Il se distingue de suite de *C. hispanus* par les téguments nullement rugueux et par l'absence de strie transversale au céphalothorax.

3. CHELIFER SAVIGNYI sp. nov.

Long. 2,5^{mm}.

Cephalothorax et pedes maxillares læte rufo-brunnei, segmenta abdominalia brunneo-testacea, pedes testacei subpellucents. —

Cephalothorax coriaceus, opacus, longior quam latior, antice parum attenuatus et rotundatus, striga 1^a integra profunda fere recta, striga 2^a obsoletissima, pilis simplicibus parce vestitus. — Segmenta abdominalia coriacea, setis fulvis et longis ordinibus transversis dispositis ornata. — Pedes maxillares robusti parum longi, coxa nitida, trochantero femoreque supra regulariter et tenue coriaceis, tibia et manu fere lævibus nitidis, articulis cunctis setis simplicibus sat longis parce vestitis; trochantero vix longiore quam latiore supra et postice convexo; femore breve pediculato, crassissimo ad apicem evidenter attenuato, antice fere recto, postice præsertim ad basin convexo; tibia breve pediculata dein late ovali, longiore quam latiore intus valde et regulariter convexa extus in parte 2^a parum convexa; manu tibia evidenter latiore, ad basin fere recta ad apicem attenuata; digitis robustis, curvatis, manu parum brevioribus. — Pedes breves.

Un seul individu, trouvé dans une maison à Ramlé, par M. A. Letourneux.

Voisin de *C. nodosus* Schr., dont il diffère surtout par le céphalothorax chagriné mat, par la main moins ovale, tronquée presque droit à la base; il se rapproche aussi de *C. anachoreta* E. Simon (*Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1878, p. 151) d'Algérie, mais s'en distingue par les doigts plus longs et la seconde strie du céphalothorax effacée.

4. GARYPUS BEAUVOISI Sav., *Egypte, Ar.*, pl. VIII, f. 6.

Commun sur le littoral, sous les pierres et les fucus de la plage.

5. OLPIMUM PALLIPES H. Lucas, *Expl. Alg. Ar.*, p. 227, pl. XVIII, f. 3, 1845.

Olpium Hermannii L. Koch, *Darst. Eur. Chernet.*, p. 37, 1873.

— *pallipes* E. Simon, *Ar. Fr.*, VII, p. 49.

Très commun à Ramlé sous les pierres et les détritns. — Cette espèce est répandue dans tout le nord de l'Afrique et le midi de l'Europe.

6. OLPIMUM KOCHI E. Simon.

Chelifes Hermannii Sav., *Egypte, Ar.*, pl. VIII, f. 5, 1827.

Cephalothorax nigerrimus ad marginem posticum dilutior et rufescens, nitidus, transversim et oblique irregulariter striatus,

longior quam latior, antice ante oculos attenuatus et truncatus. — Abdomen segmentis I, II, III albo testaceis membranaceis, segmentis reliquis nigris nitidis. — Pedes maxillares longi parum robusti, trochantero, femore tibiaque in medio obscure fusco-olivaceis ad basin atque ad apicem rufescentibus, manu nigerima, digitis rufis; articulis cunctis fere nitidis setis gracillimis parum longis parce vestitis; trochantero longiore quam latiore antice fere recto, supra et postice paulo convexo; femore longo parum robusto, fere cylindrico ad basin abrupte angustiore; tibia femore longitudine æqua, sat longe pediculata, parum lata, longe ovata, ad basin atque ad apicem attenuata; manu tibia multo latiore, ad basin obtuse truncata, ad apicem attenuata, intus valde extus parum convexa, digitis manu longitudine fere æqua, sat gracilibus et curvatis. — Pedes albo-testacei pellucentes, sat longi, femoribus III et IV valde compressis.

Commun sous les pierres au nord de la grande Pyramide (A. Letourneux).

Espèce très distincte de *O. pallipes* Lucas (*Hermanni* L. Koch) principalement par le fémur et le tibia de la patte-mâchoire plus allongés, la main beaucoup plus large et d'une autre forme, étant large à la base et atténuée et non pas régulièrement ovale.

Le nom d'*Hermanni* ne peut être maintenu, ayant été employé par Savigny par confusion avec le *C. Hermanni* de Leach, qui est synonyme de *C. caneroides* L.

Genus MINNIZA nov. gen.

Gen. *Olpium* affinis sed cephalothorace multo longiore quam latiore plano antice haud convexo, oculis a margine cephalothoracis haud separatis, abdomine longissimo, vermiformi, omnino membranaceo.

Dans le genre *Olpium* le céphalothorax est plus court, plus ou moins convexe et les yeux sont séparés de la marge par un espace au moins égal à leur diamètre, enfin l'abdomen, de forme normale, est plus ou moins coriacé en dessus.

7. MINNIZA VERMIS sp. nov.

Long. 3^{mm}.

Cephalothorax obscure fuscus, nitidus, haud striatus, supra planus, multo longior quam latior, fere parallelus, antice vix

attenuatus. Oculi æqui, subcontinentes, a margine cephalothoracis vix separati. — Abdomen longissimum vermiforme, molle, albo testaceum plus minus rufescens, segmentis antice et supra et infra subtilissime striatis. — Pedes maxillares obscure fusci, trochantero digitisque rufescentibus, articulis cunctis nitidis, setis gracillimis sat longis parce vestitis; trochantero longiore quam latiore antice recto postice leviter convexo; femore crasso, breve pediculato ad apicem sensim attenuato; tibia femore longitudine æqua, pediculo brevi et angusto, dein sat longe ovato, extus leviter intus magis convexo, manu tibia paululum latiore ad basin fere recta ad apicem paullo attenuata, digitis crassis manu evidenter brevioribus. — Pedes breves, albo-testacei subpellucents.

Le Mex, près la corne occidentale du lac Maréotis (découvert par M. A. Letourneux).

8. CHTHONIUS TETRACHELATUS Preyss., 1790.

Ch. trombidioides Auct.

Trouvé à Ramlé sous les pierres par M. A. Letourneux.

Espèce répandue dans toute l'Europe.
